

Recomendaciones del Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR Campaña 2019/20

Variedades tolerantes a RIZOMANIA

TRES O MÁS años de ensayo

| Casa comercial | Variedad | NASCENCIA | | PRODUCCIÓN | | | Cerc. |
|---------------------------|----------------------------|-----------|------|------------|----------|--------|-------|
| | | Vigor | Real | Peso | Polariz. | Azúcar | |
| FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA | PAPILLON | B | B | B | B | B | *** |
| KWS | ANABELLA ⁽¹⁾ | B | MB | B | MB | B | *** |
| | HELVETIA ⁽¹⁾⁽²⁾ | N | N | E | N | MB | ** |
| | LOUISA ⁽¹⁾ | N | B | B | MB | MB | ** |
| | LUNELLA ⁽¹⁾ | B | N | B | N | B | * |
| LIMAGRAIN | ATHENEA ⁽¹⁾⁽²⁾ | B | N | B | E | MB | * |
| | BTS 505 ⁽¹⁾⁽²⁾ | N | B | B | N | B | ** |
| OLEOKELSA | ROSANORA | N | B | B | B | B | ** |

DOS años de ensayo

| Casa comercial | Variedad | NASCENCIA | | PRODUCCIÓN | | | Cerc. |
|----------------|--------------------------|-----------|------|------------|----------|--------|-------|
| | | Vigor | Real | Peso | Polariz. | Azúcar | |
| KWS | COMPETITA ⁽²⁾ | B | B | B | N | N | ** |
| STRUBE ESPAÑA | CALLEDIA | N | B | N | MB | B | ** |

Variedades tolerantes-resistentes al NEMATODO DE QUISTE (*Heterodera schachtii*)

| Casa comercial | Variedad | NASCENCIA | | PRODUCCIÓN | | | Cerc. |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|------|------------|----------|--------|-------|
| | | Vigor | Real | Peso | Polariz. | Azúcar | |
| TRES o MAS años de ensayo | | | | | | | |
| KWS | ANABELLA | N | N | N | B | B | *** |
| | HELVETIA ⁽²⁾ | B | N | B | N | N | ** |
| | LOUISA | N | B | N | MB | B | ** |
| LIMAGRAIN | BTS 505 ⁽²⁾ | B | B | N | N | N | ** |
| STRUBE ESPAÑA | VIENETTA | E | B | N | MB | N | ** |

DOS años de ensayo

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|---|----|----|----|----|
| FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA | BALI | N | B | N | N | N | ** |
| KWS | LUNELLA | B | N | MB | N | MB | * |
| | TESSILIA | B | B | B | B | B | ** |
| LIMAGRAIN | ATHENEA ⁽²⁾ | N | N | N | MB | N | * |

NORMAL

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

Valoración de tolerancia a cercospora según los ensayos de la campaña 18-19

* Baja ** Media *** Alta

(1) Además tolerante a nematodos

(2) Tolerante a la nueva raza de rizomanía